

	Modello informativo e preparazione TAC	Mod.05.95 ter
		Rev.3 Aggiornato al 14/06/2022
		Pag. 1 di 1

Gentile Signora/e,

desideriamo fornirle alcune informazioni circa la procedura di preparazione all'esame cui si sottoporrà.

L'esame non si esegue in gravidanza o se esiste un sospetto di gravidanza.

ESAMI TAC CON MEZZO DI CONTRASTO

- DIGIUNO ASSOLUTO da almeno 6 ore
- Portare esame del sangue CREATININEMIA eseguito non oltre 30 gg prima dell'esecuzione della prestazione
- Portare ELETTRICARDIOGRAMMA eseguito non oltre 30 gg prima dell'esecuzione della prestazione (SOLO PER PAZIENTI CON PROBLEMI CARDIACI)
- Portare esami eseguiti precedentemente
- Portare glicemia solo in presenza di patologia diabetica
- Portare TSH solo in presenza di patologie tiroidee
- Per i pazienti diabetici in terapia con metformina: sospendere l'assunzione nelle 24-48 ore precedenti l'esame, riprendere la terapia dopo 48 ore previo controllo di creatininemia

ESAMI TAC ADDOME E TORACE SENZA MEZZO DI CONTRASTO

- DIGIUNO ASSOLUTO da almeno 6 ore